



Zieleń Indocyjaninowa Verdyne ICG

Diagnostic Green

**PRZEDŁUŻONA
OFERTA SPECJALNA!**

**WAŻNA
DO
31.03.2021!**

Fiolka 25mg

295 zł netto

(przy zam. min. 2 opakowań)

Cena netto po zakończeniu promocji min. 335 zł netto/fiolkę

Fiolka 50mg

495 zł netto

(przy zam. min. 2 opakowań)

Cena netto po zakończeniu promocji min. 535 zł netto/fiolkę

Informacje logistyczne

Produkt	Zawartość	Ilość fiolek w opakowaniu	Wymiary opakowania
Verdyne 25mg	Fiolka z 25mg proszku ICG do rozcieńczenia 5mg/ml	5	10.5cm x 9.5cm x 8cm
Verdyne 50mg	Fiolka z 50mg proszku ICG do rozcieńczenia 5mg/ml	5	10.5cm x 9.5cm x 8cm

Dostępne w ofercie specjalnej wyłącznie w hurtowni LogFarma

32-085 Modlniczka, Komandosów 1/1
tel.: (12) 655 14 46 (Dział zamówień - wybierz 1)
e-mail: zamow@logfarma.pl



AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
PRODUKTÓW DIAGNOSTIC GREEN
W POLSCE

Informacje na temat stosowania Verdye

Nazwa produktu leczniczego

Verdye 5 mg/ml iniekcje 25 mg/50 mg

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Postać farmaceutyczna

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Ciemnozielony proszek.

Szczegółowe dane kliniczne

Wskazania terapeutyczne

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Wskazania diagnostyczne

Diagnostyka kardiologiczna, krążenia i mikrokrążenia:

- pomiar pojemności minutowej i objętości wyrzutowej serca
- pomiar objętości krwi krążącej
- pomiar perfuzji mózgowej.

Diagnostyka czynności wątroby

- pomiar przepływu krwi przez wątrobę
- pomiar funkcji wydzielniczej wątroby.

Okulistyczna diagnostyka angiograficzna:

- pomiar perfuzji naczyńiówki.

Dawkowanie i Sposób podawania

Sposób podawania

Przed podaniem, proszek należy zrekonstruować w wodzie do wstrzykiwań.

Okres trwałości

5 lat. Roztwór należy zużyć natychmiast po rekonstrukcji; należy chronić go przed światłem.

Instrukcja użytkowania i obsługi

Ten produkt leczniczy należy zrekonstruować natychmiast przed użyciem. Ten produkt leczniczy należy zrekonstruować przez dodanie odpowiednio 5 ml wody do wstrzykiwań do fiolki zawierającej 25 mg substancji czynnej lub dodanie 10 ml wody do wstrzykiwań do fiolki zawierającej 50 mg substancji, wskutek czego w obu przypadkach powstanie ciemnozielony

roztwór do wstrzykiwań o stężeniu 5 mg/ml (0.5 % w/v). W przypadku zauważenia niezgodności w postaci nieklarownego roztworu, zrekonstruowany roztwór należy wyrzucić. Dokładnie obejrzyć wzrokowo zrekonstruowany roztwór. Należy stosować wyłącznie klarowne roztwory bez obecności widocznych cząstek.

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku.

Zrekonstruowany roztwór jest klarowny i nie zawiera widocznych cząstek. Procedury diagnostyczne z użyciem produktu Verdye należy przeprowadzać pod nadzorem lekarza. Produkt Verdye jest przeznaczony do wstrzykiwania dożylnego za pomocą igły do wstrzykiwań, centralnego lub obwodowego cewnika żylnego lub cewnika sercowego.

Sposób i miejsce podania produktu Verdye mają zasadnicze znaczenie dla jakości pomiarów. Przede wszystkim, w celu uzyskania optymalnej jakości należy najpierw przeprowadzić przepływ krzywej rozcieńczenia substancji wskaźnikowej, wstrzyknięcie należy wykonać możliwie najbliżej łożyska naczyniowego, narządu lub tkanki docelowej.

W przypadku wstrzyknięcia obwodowego, wstrzyknięcie należy wykonać natychmiast po założeniu opaski uciskowej, a po jej zdjęciu należy unieść rękę do góry. Zapewni to szybki transport barwnika z miejsca wstrzyknięcia, a wstrzyknięcie obwodowe jest w ten sposób praktycznie równoważne wstrzyknięciu do żyły centralnej.

Dawkowanie

Dawka pojedyncza w celu wykonania pomiaru u osób dorosłych, osób w podeszłym wieku oraz dzieci:
Diagnostyka serca, układu krążenia, mikrokrążenia oraz perfuzji tkankowej, jak również **przepływu krwi w mózgu**: 0,1 do

0,3 mg/kg masy ciała w postaci wstrzyknięcia bolusowego.

Diagnostyka czynności wątroby: 0,25 – 0,5 mg/kg masy ciała w postaci wstrzyknięcia bolusowego.

Angiografia okulistyczna: 0,1 do 0,3 mg/kg masy ciała w postaci wstrzyknięcia bolusowego.

Całkowita dawka dobową:

Osoby dorosłe, osoby w podeszłym wieku, młodzież w wieku 11-18 lat:

Całkowita dawka dobową produktu Verdye nie powinna przekraczać 5 mg/kg masy ciała.

Dzieci w wieku 2 – 11 lat:

Całkowita dawka dobową nie powinna przekraczać 2,5 mg/kg masy ciała.

Dzieci w wieku 0 – 2 lat:

Całkowita dawka dobową nie powinna przekraczać 1,25 mg/kg masy ciała.

Przeciwwskazania

Ze względów bezpieczeństwa stosowanie produktu Verdye jest przeciwwskazane w następujących przypadkach:

- pacjenci z nadwrażliwością na zieleń indocyjaninową lub jodek sodu, chyba, że zostaną podjęte specjalne środki ostrożności,
- pacjenci z nadwrażliwością na jod,
- pacjenci z nadczynnością tarczycy, pacjenci z autonomicznymi gruczolakami tarczycy
- z uwagi na to, że w eksperymentach in vitro wykazano, że zieleń indocyjaninowa zastępuje bilirubinę w wiązaniu białka, produktu Verdye nie należy stosować u wcześniaków ani noworodków, u których zaleca się przeprowadzenie transfuzji wymiennej z powodu hiperbilirubinemii,
- jeżeli wstrzyknięcie produktu Verdye było źle tolerowane w przeszłości, nie można go podawać ponownie, ponieważ może dojść do ciężkiej reakcji anafilaktycznej.

Pełne informacje na temat produktu znajdują się na stronie www.diagnosticgreen.com